

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: September 2011 **Neue Pillen!**



Name	Rolex	Mitsubishi	Mitsubishi
Gewicht	236.95 mg	259.99 mg	239.3 mg
Durchmesser	9.22 mm	9.26 mm	9.3 mm
Dicke	3.19 mm	3.68 mm	3.7 mm
Bruchrille	Keine	keine	keine
Bemerkungen			
Farbe	Weiss	Grün/türkis	Grün/türkis
Inhaltsstoff	m-CPP 39.4 mg Metoclopramid 7.2 mg	m-CPP 20.5 mg Metoclopramid 4.8 mg Domperidon 2.5 mg	m-CPP 33.5 mg Metoclopramid 8.4 mg
Getestet in	Zürich, August 2011	Zürich, August 2011	Zürich, Sept. 2011

Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkauften Pillen enthalten kein MDMA, sondern eine hohe Dosis des Piperazins m-CPP und die Substanzen Metoclopramid und Domperidon. m-CPP ruft bei manchen Personen ein MDMA-ähnliche Wirkung hervor (eher halluzinogen, weniger entaktogen), bei vielen Personen stellen sich aber nur die unten beschriebenen Nebenwirkungen ein. Es besteht die Gefahr, dass beim Ausbleiben der MDMA-typischen Wirkung nachgespickt wird und somit hohe Mengen m-CPP eingenommen werden. **Die Wechselwirkung zwischen m-CPP, Domperidon und Metoclopramid sind noch unerforscht!**

Infos zu m-CPP

Substanz: m-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft.

Konsumform: geschluckt.

Wirkung: Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung (nach 1 – 2 Stunden) und leichte Glücksgefühle können sich einstellen. Die Wirkdauer beträgt 4 – 8 Stunden. m-CPP hat keine leistungs-steigernde Wirkung, Herzschlag und Puls sind nicht erhöht.

Infos zu Domperidon

Domperidon ist ein Arzneimittel, welches zur Behandlung und Vorbeugung von Erbrechen und Übelkeit Anwendung findet (Antiemetikum). **Die maximale Dosis wird mit 80mg/Tag für erwachsene Personen angegeben!**

Infos zu Metoclopramid

Metoclopramid (MCP) ist, wie Domperidon, ein Arzneistoff aus der Gruppe der Antiemetika und gehört zur Gruppe der Dopamin-Antagonisten. Im Gegensatz zu Domperidon überwindet MCP die Blut-Hirn-Schranke und kann somit Einfluss auf das zentrale Nervensystem haben. **Die maximale Dosis wird mit 40mg/Tag für erwachsene Personen angegeben!**

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Risiken – Nebenwirkungen: Risiken und Nebenwirkungen treten meist stärker zum Vorschein als die wahrnehmungsverändernde Wirkung: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Zittern, Nervosität, Schweratmigkeit und Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmung. Achtung: Mischkonsum zusammen mit MDMA (XTC) kann zu Krampfanfällen führen! Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf unbekannte Substanzen nie nachspicken!
- Bei ausbleibender Wirkung 2 Stunden warten und nicht gleich nachspicken!