

## Vorsicht: XTC-Tablette mit Mephedron (4-MMC)

Logo	<b>MCAT (Katzenkopf)</b>
Gewicht	286.3 mg
Grösse	9.2 x 8.4 mm
Dicke	5.3 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	Hellblau
Inhaltsstoffe	<b>Mephedron (4-MMC) *HCl: 134.6 mg 2 Syntheseverunreinigungen</b>
Getestet in	Zürich (DIZ), 08. November 2019



### Risikoeinschätzung

Diese XTC-Tablette enthält kein MDMA, sondern **Mephedron (4-MMC)**. Mephedron ist eine psychoaktive Substanz und gehört innerhalb der Familie der Phenethylamine zu den Cathinon-Derivaten. Bei einer Verwechslung mit MDMA besteht, da sich bei dieser Tablette keine MDMA-Wirkung entfaltet, das Risiko, dass nachdosiert und ungewollt eine hohe Dosis 4-MMC eingenommen wird. Diese Tablette enthält neben Mephedron **zwei unbekannte Syntheseverunreinigungen**. Da keine Informationen betreffend Risiken, Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit Mephedron vorliegen, geht man beim Konsum dieser Tablette ein zusätzliches, unbekanntes Gesundheitsrisiko ein. Da es sich bei Mephedron um ein Research Chemical handelt und Risiken und Langzeitfolgen kaum erforscht sind, wird vom Konsum abgeraten!

Bei XTC-Tabletten kommt es neben hohen Dosierungen auch immer wieder zu Falschdeklarationen; auch diese deshalb unbedingt vor dem Konsum testen lassen!

### Infos zu Mephedron

**Substanz:** 4-Methylmethcathinon /4-MMC

**Dosierung:** oral: leicht 25-100 mg / üblich: 100-175 mg / stark: 150-250+ mg

**Wirkungseintritt / Wirkdauer:** oral nach ca. 30-60 Min. oral ca. 2-5 Std.

**Wirkung:** Die Wirkung ist ähnlich derer von Methcathinon, Kokain und MDMA. Mephedron verursacht Euphorie und Stimulation, gesteigerten Rededrang, erhöhte Leistungsfähigkeit und veränderte Sinneswahrnehmungen. Das Bedürfnis nach Essen und Schlaf wird unterdrückt.

**Nebenwirkungen:** Beim Konsum von Mephedron können verschiedene unerwünschte Effekte auftreten: Mundtrockenheit, Pupillenerweiterung, Kieferknirschen, erhöhte Herzrate, Anstieg der Körpertemperatur, Angstzustände oder Paranoia. Durch das verringerte Durstbedürfnis und mangelnde Flüssigkeitsaufnahme besteht die Gefahr von Dehydration. Hohe Dosen Mephedron führen zu psychotischen Reaktionen und können Schizophrenien verstärken. Es besteht die Gefahr einer Abhängigkeit mit Symptomen wie Unruhe, Zittern, Schlaflosigkeit und Hyperaktivität. Aufgrund des starken Cravings (unwiderstehliches und unkontrollierbares Verlangen nach Konsum), besteht die Gefahr, dass zu schnell nachgelegt wird und die Nebenwirkungen überwiegen.

### Generelle Safer-Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.