

Warnung: hochdosierte XTC Pille mit MDA

Datum: **Dezember 2012**

Name	Audi
Gewicht	343.26 mg
Durchmesser	8.30 mm
Dicke	5.66 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	Blau
Inhaltsstoff	MDMA 139.21 mg MDA 0.65 mg
Getestet in	Zürich, Dezember 2012



Risikoeinschätzung

Diese XTC Pille enthält neben einer hohen Dosis MDMA das synthetische Amphetaminderivat MDA, welches ähnlich wirkt wie MDMA. MDA wirkt härter und stärker als MDMA und weniger „magisch“, zudem ist eine halluzinogene Komponente möglich. Des Weiteren beinhaltet diese XTC Pille mehr als 120mg MDMA, was einer hohen Dosis entspricht und zu einer Zunahme der unangenehmen Nebenwirkungen wie beispielsweise Kieferkrämpfe, Augen- oder Nervenzucken bis hin zu Krampfanfällen führen kann.

Infos zu MDA

Die Wirkung von MDA ist vergleichbar mit der von MDMA, wird aber allgemein als „kälter“ beschrieben. Die Unterschiede liegen in der Dauer und Intensität. Das Glücksgefühl (Magic-Feeling) ist weniger ausgeprägt als bei MDMA, dafür weist MDA eine leicht halluzinogene Wirkung und **eine Wirkdauer von 8-12 Stunden** auf, im Gegensatz zu MDMA, welches 4-6 Stunden wirkt. Die Dosierung ist vergleichbar mit der von MDMA; 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen und 1.5 mg pro kg Körpergewicht für Männer.

Risiken: MDA ist sowohl neurotoxisch (hirnschädigend) wie auch hepatotoxisch (leberschädigend), bei längerer Einnahme von MDA kann es zu schizophrenieähnlichen Symptomen kommen.

Infos zu MDMA

MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühle sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

Nebenwirkungen: Kiefermahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und schaue wie die Wirkung ist.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht jede Party hat einmal ein Ende.

