

Methylone verkauft als XTC

Datum: **Juli 2012**



Name	Quadrat	Kein Logo
Gewicht	282.8 mg	238.3 mg
Durchmesser	8.1 mg	8.2 mg
Dicke	5.4 mg	4.3 mg
Bruchrille	Nein	Nein
Farbe	Grün	Grün gesprenkelt
Inhaltsstoff	134.8 mg Methylone	33.2 mg Methylone
Getestet in	Zürich, April 2012	Zürich, Juli 2012

Risikoeinschätzung

Methylone ist kein MDMA! Die Nebenwirkungen und die (Langzeit-)Risiken von Methylone sind kaum erforscht. Da es bis zum Wirkungseintritt von Methylone länger dauert, als bei MDMA, besteht die Gefahr, dass Nachgelegt und Methylone in hohen Dosen konsumiert und somit überdosisiert wird.

Methylon ("Explosion", "Ease")

Substanz: Methylon (2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one oder Methylendioxy-Methcathinon) gehört zur Gruppe der Phentylamine und wird als gelbliche Flüssigkeit oder weisses Pulver angeboten.

Konsumformen: geschluckt, geschnupft und selten intravenös gespritzt.

Dosierung: 180– max. 250 mg oral, 50- max. 150 mg nasal. Verzichte aufs Nachwerfen, es führt bei Methylon zu keiner Intensivierung des Flashes

Wirkungseintritt: 20-75 Min. (schneller bei Einnahme auf leeren Magen).

Wirkdauer: 3-6 Std.

Wirkung: Vergleichbar mit MDMA, aber sanfter und weniger entaktogen. Die Wirkung ist konstanter, der Hangover geringer als bei MDMA.

Risiken und Nebenwirkungen: Kurzzeitnebenwirkungen sind erhöhte Körpertemperatur und Herzschlag, erweiterte Pupillen sowie Kieferspannen.

Safer Use Regeln

- Gekauftes MDMA antesten, das heisst: kleinere Menge als üblich nehmen, ca. 2 Stunden warten und die Wirkung abwarten.
- Bei Verdacht auf Methylone nicht einfach nachlegen.
- Aufgrund der mangelhaften Wissenslage sollte auf den Konsum von Methylone verzichtet werden.