

# Achtung! XTC mit Amphetamin

Datum: **Juni 2012**



| Name         | Ohne Logo                                       | Rössli  |
|--------------|---|---|
| Gewicht      | 337.3 mg  | 226.5 mg  |
| Durchmesser  | 8.2 mm  | 8.1 mm  |
| Dicke        | 5.4 mm  | 3.8 mm  |
| Bruchrille   | Ja  | nein  |
| Farbe        | rosa  | gelb  |
| Inhaltsstoff | <b>91.6 mg MDMA</b><br><b>3.9 mg Amphetamin</b> | <b>119.3 mg MDMA</b><br><b>1.9 mg Amphetamin</b><br><b>2.6 mg Coffein</b> |
| Getestet in  | Zürich, März 2012                               | Zürich, <b>Juni 2012</b>  |

## Risikoeinschätzung

Diese Pille enthält neben MDMA noch Amphetamin und Coffein. Die Kombination dieser Substanzen führt zu einer stärkeren Serotonin- und Dopaminkonzentration im Hirn. Es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Gehirnschäden. Ein längerer Hangover und depressive Verstimmungen können die Folge sein.

## Infos zu Amphetamin

Freisetzung der körpereigenen Leistungsdroge Noradrenalin, Steigerung des Selbstwertgefühls durch die gleichzeitige Ausschüttung von Dopamin. Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Hunger und Schlafbedürfnis, Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und gesteigerter Rededrang (Laberflash).

**Wirkungseintritt:** geschnupft nach ca. 2-10 Min., geschluckt nach 30-45 Min.

**Wirkdauer:** 6-12 Std. (Amphetamin wird im Körper schlecht abgebaut).

**Risiken:** Kurzzeitriskiken können Zittern, Unruhe, Übelkeit, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Nervosität, Gereiztheit und Appetitlosigkeit, aggressives Verhalten sein. Bei hohen Dosen: Halluzinationen, Kreislaufversagen, Schlaganfälle sowie Nieren-, Leber-, Herzversagen und Zustände tiefer Bewusstlosigkeit. Eine oft unterschätzte Gefahr ist das Ansteigen der Körpertemperatur bis auf 41°C mit lebensbedrohlicher Überhitzung und Austrocknung des Körpers als Folge. Eine Abhängigkeit mit psychischen Symptomen kann sich langfristig einstellen.

## Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf Amphetamin nie nachspicken!

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch