

# Warnung: Hochdosierte XTC mit Amphetamin und Coffein

Datum: **Dezember 2012**

Name	<b>Stern</b>
Gewicht	409.64 mg
Durchmesser	8.10 mm
Dicke	7.00 mm
Bruchrille	Nein
Bemerkung	Pille ist sehr dick
Farbe	Blau
Inhaltsstoff	<b>MDMA 144.50 mg</b> <b>Amphetamin 3.66 mg</b> <b>Coffein 56.77 mg</b>
Getestet in	Zürich, <b>Dezember 2012</b>



## Risikoeinschätzung

Diese Pille enthält neben einer hohen Dosis MDMA, auch Amphetamin und Coffein. Dieser Mischkonsum führt zu einer Verstärkung der Wirkung und zu einer hohen Noradrenalin- und Dopaminkonzentration. Diese hohe Konzentration ist neurotoxischer (hirnschädigender) und führt zu einer starken Austrocknung des Körpers. Die Belastung für den Herzkreislauf ist sehr hoch.

## Infos zu Amphetamin

Freisetzung der körpereigenen Leistungsdroge Noradrenalin, Steigerung des Selbstwertgefühls durch die gleichzeitige Ausschüttung von Dopamin. Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Hunger und Schlafbedürfnis, Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und gesteigerter Rededrang (Laberflash).

**Wirkungseintritt:** geschnupft nach ca. 2-10 Min., geschluckt nach 30-45 Min.  
Wirkdauer: 6-12 Std. (Amphetamin wird im Körper schlecht abgebaut)

## Infos zu MDMA

**Dosierung:** max. 1,5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1,3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

**Wirkung:** MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühl sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

**Nebenwirkungen:** Kieferkrämpfe, Muskelzittern, Übelkeit/Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

## Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzuspicken.

