

# Warnung: hochdosierte XTC's

Datum: Juni 2013



Name	Lacoste	Lacoste	Apfel	OXA
Gewicht	293.6 mg	294.2 mg	281.7 mg	539.1 mg
Durchmesser	8.1 mm	8.1 mm	8.1 mm	11.9 mm!
Dicke	4.7 mm	4.6 mm	4.8 mm	4.58 mm
Bruchrille	Ja	Ja	Nein	Nein
Farbe	Grün	Grün	Hellgrün (Pistache)	Rosa
Inhaltsstoffe	<b>MDMA*HCl 191.4mg</b>	<b>MDMA*HCL 138.9mg</b>	<b>MDMA*HCL 128.1mg</b> <b>MDA*HCL 1.2mg</b>	<b>MDMA*HCL 132.3mg</b> <b>Coffein 79.2mg</b>
Getestet in	Zürich, Juni 2013	Zürich, Juni 2013	Zürich, Juni 2013	Zürich, Juni 2013

## Risikoeinschätzung

Über 120mg MDMA\*HCl können zu viel sein. Nebenwirkungen wie „Kiefer mahlen“, Augen- und Nervenzucken, bis hin zu Krampfanfällen können bei hohen MDMA Dosen auftreten. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an und es können Halluzinationen auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit auf. Bei einer regelmässigen hoch dosierten Einnahme von MDMA ist die Wahrscheinlichkeit, dass irreparable Hirnschäden entstehen, grösser. Koffein fördert das Austrocknen noch zusätzlich!

## Infos zu MDMA\*HCl

**Dosierung:** max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

**Wirkung:** MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühle sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

**Nebenwirkungen:** Kiefermahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und schaue wie die Wirkung ist.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

