

XTC Pille mit MDMA und MDA

Datum: **Dezember 2013**

Name	Pentagramm
Gewicht	317.1 mg
Durchmesser	8.6 mm
Dicke	3.8 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	rot mit weissen Sprenkeln
Inhaltsstoff	MDMA 69.1 mg MDA 34.6 mg
Getestet in	Zürich, Dezember 2013



Risikoeinschätzung

Diese XTC Pille enthält neben einer nicht geringen Dosis MDMA das synthetische Amphetaminderivat MDA. Die Wirkung von MDA ist ähnlich wie MDMA, wird jedoch als härter, stärker und weniger „magisch“ als MDMA empfunden. Zudem ist eine halluzinogene Wirkkomponente möglich. Da diese Tablette zwei psychoaktive Substanzen enthält, erhöht sich, infolge des Mischkonsums, die körperliche Belastung automatisch.

Infos zu MDA

Die Wirkung von MDA ist vergleichbar mit der von MDMA, wird aber allgemein als „kälter“ beschrieben. Die Unterschiede liegen in der Dauer und Intensität. Das Glücksgefühl (Magic-Feeling) ist weniger ausgeprägt als bei MDMA, dafür weist MDA eine leicht halluzinogene Wirkung und **eine Wirkdauer von 8-12 Stunden** auf, im Gegensatz zu MDMA, welches 4-6 Stunden wirkt. Die Dosierung ist vergleichbar mit der von MDMA: 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen und 1.5 mg pro kg Körpergewicht für Männer.

Risiken: MDA ist sowohl neurotoxisch (hirnschädigend) wie auch hepatotoxisch (leberschädigend). Bei längerer Einnahme von MDA kann es zu Schizophrenie ähnlichen Symptomen kommen.

Infos zu MDMA

MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühle sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

Nebenwirkungen: Kiefernmalen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und schaue wie die Wirkung ist.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht jede Party hat einmal ein Ende.

