

# Info: XTC Pille mit Coffein und MDMA

Neue Pillen: **Dezember 2013**

Name	<b>Bart Simpson</b>
Gewicht	294.1 mg
Durchmesser	8.8 mm
Dicke	6.6 mm
Bruchrille	Nein
Bemerkungen	
Farbe	grün
Inhaltsstoff	<b>Coffein 81.7 mg</b> <b>MDMA 115.5 mg</b>
Getestet in	<b>Zürich, Dezember 2013</b>



## Risikoeinschätzung MDMA+Coffein

Die Kombination beider Substanzen verstärkt den stimulierenden Effekt sowie die Gefahr der Dehydratation, da Coffein dem Körper zusätzlich Wasser entzieht.

## Infos zu Coffein

Coffein ist ein Alkaloid der Kaffeebohnen, Tee- und Mateblättern, Kolanüssen, etc.

**Wirkungseintritt und -dauer:** nach 10-60 Min. / 2-3 Std.

**Wirkung:** Coffein macht wach, beschleunigt den Herzschlag und steigert vorübergehend die geistige Leistungsfähigkeit. In höheren Dosen (300-600 mg = ca. 8 Tassen Kaffee) erzeugt er Euphorie.

**Nebenwirkungen:** Coffein entzieht dem Körper Flüssigkeit (Dehydratation). Bei sehr hohen Dosen können Schweißausbrüche, Herzflattern, Harndrang, Herzrhythmusstörungen, starke Wahrnehmungsstörungen, Zittern, Nervosität und Schlafstörungen auftreten.

## Infos zu MDMA\*HCl

**Dosierung:** max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und -Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

**Wirkung:** MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühl werden reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit wird erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

**Nebenwirkungen:** Kiefermahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzeschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke, mach von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht: Jede Party hat einmal ein Ende.

