

Warnung: XTC mit Amphetamin und Coffein

Datum: **Mai 2013**



Name	Rolling Stones Zunge	McDonald's	Fragezeichen
Gewicht	300.8 mg	268.3 mg	309.7 mg
Durchmesser	8.1 mm	7.1 mm	8.1 mm
Dicke	5.1 mm	5.6 mm	4.6 mm
Bruchrille	Nein	Nein	Nein
Farbe	Grün	rot	Weiss gesprenkelt
Inhaltsstoff	MDMA*HCl 75.8 mg Amphetamin*HCl 3.7 mg Coffein 43.5 mg	MDMA*HCl 95.7mg Amphetamin*HCl 0.3 mg Coffein 0.5 mg	MDMA*HCl 45.8 mg Amphetamin*HCl 1.4 mg Coffein 4.6 mg
Getestet in	Zürich, Mai 2013	Zürich, Mai 2013	Zürich, Mai 2013

Risikoeinschätzung

Diese Pillen enthalten neben MDMA auch Amphetamin und Coffein. Dieser Mischkonsum führt zu einer Verstärkung der Wirkung und zu einer hohen Noradrenalin- und Dopaminkonzentration. Diese hohe Konzentration ist hirnschädigender und führt zu einer starken Austrocknung des Körpers. Die Belastung für den Herzkreislauf ist sehr hoch.

Infos zu Amphetamin

Freisetzung der körpereigenen Leistungsdroge Noradrenalin, Steigerung des Selbstwertgefühls durch die gleichzeitige Ausschüttung von Dopamin. Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Hunger und Schlafbedürfnis, Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und gesteigerter Rededrang (Laberflash).

Wirkungseintritt: geschnupft nach ca. 2-10 Min., geschluckt nach 30-45 Min.
Wirkdauer: 6-12 Std.

Infos zu MDMA

Dosierung: max. 1,5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1,3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und -Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung von Serotonin. Hunger- und Durstgefühl sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Du fühlst dich leicht und unbeschwert, ein wohlige Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

Nebenwirkungen: Kieferkrämpfe, Muskelzittern, Übelkeit/Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzuspielen.

