

Warnung: Ecstasy mit MBZP und m-CPP

Datum: **Mai 2014**

Name	C
Gewicht	247.7 mg
Durchmesser	8.1 mm
Dicke	3.9 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	Rot (Pink) mit Sprengel
Inhaltsstoff	mCPP 18.7 mg MBZP 39.7 mg MDMA 15.5 mg
Getestet in	Basel, Mai 2014



Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkaufte Pille enthält eine kleine Menge MDMA sowie die beiden Piperazine MBZP und m-CPP. MBZP ist ein stimulierendes Benzylpiperazin-Derivat, m-CPP ist leicht stimulierend und ruft in seltenen Fällen eine MDMA-ähnliche Wirkung hervor. Meistens ruft m-CPP vor allem Nebenwirkungen, wie Kopfschmerzen und Übelkeit, hervor. Wie die Wirkung und Nebenwirkungen bei der Kombination dieser dreier Substanzen ausfallen, kann nicht vorausgesagt werden. Vom Konsum dieser Tablette ist deshalb abzuraten!

Infos zu MBZP

Substanz: MBZP (1-Benzyl-4-Methylpiperazin) ist ein Piperazinderivat. **Wirkung:** MBZP ist eine Stimulanz, welche zur Freisetzung von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin führt und die Wiederaufnahme dieser Botenstoffe hemmt. Die Wirkung liegt zwischen Amphetamin und MDMA. MBZP wirkt schwächer als Benzylpiperazin. **Risiken und Nebenwirkungen:** Appetitverlust, Hitze-/Kältevallungen, starkes Schwitzen, Bluthochdruck, Magenschmerzen/Übelkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Zittern und Krampfanfälle. Bei regelmässigem Konsum treten Schlafstörungen, Energieverlust, anomale Gedanken, Gemütsschwankungen, Verwirrtheit und Reizbarkeit auf.

Infos zu m-CPP

Substanz: m-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat. **Wirkung:** Eine schwache Wahrnehmungsveränderung (nach 1 – 2 Stunden) und leichte Glücksgefühle können sich einstellen. Die Wirkdauer beträgt 4 – 8 Stunden. m-CPP hat keine leistungssteigernde Wirkung. Herzschlag und Puls werden somit nicht erhöht. **Risiken – Nebenwirkungen:** Risiken und Nebenwirkungen treten meist stärker zum Vorschein als die wahrnehmungsverändernde Wirkung. Dazu gehören Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Zittern, Nervosität, Schweratmigkeit und Übelkeit bis hin zu Erbrechen. Nach dem Konsum treten oft über mehrere Tage starke Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmung auf. Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuelle Funktionsstörungen hervorrufen.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

