

Info: XTC Pille mit Coffein und MDMA

November 2015

Name	Mitsubishi
Gewicht	222.1 mg
Durchmesser	8.0 mm
Dicke	3.6 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	Weiss
Inhaltsstoff	MDMA*HCl 9.2 mg Coffein 204.5 mg
Getestet in	Bern, November 2015



Risikoeinschätzung MDMA+Coffein

Diese XTC-Tabletten enthalten neben einer geringen Menge MDMA eine hohe Dosis Coffein. Es besteht eine erhöhte Dehydrationsgefahr (austrocknen), da Coffein dem Körper Wasser entzieht. Es besteht zudem die Gefahr einer Coffein-Überdosierung, wenn wegen ausbleiben der MDMA typischen Wirkung nachdosiert wird.

Infos zu MDMA*HCl

Dosierung: max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Frauen.

Wirkungseintritt und –Dauer: nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühle sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit wird erhöht und die Körpertemperatur sowie der Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut, die Empathie und das Kontaktbedürfnis werden gesteigert. Nebenwirkungen: Kiefermahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

Infos zu Coffein

Coffein ist ein Alkaloid der Kaffeebohnen, Tee- und Mateblättern, Kolanüssen, etc.

Wirkungseintritt und -dauer: nach 10-60 Min. / 2-3 Std.

Wirkung: Coffein macht wach, beschleunigt den Herzschlag und steigert vorübergehend die geistige Leistungsfähigkeit. In höheren Dosen (300-600 mg = ca. 8 Tassen Kaffee) erzeugt es Euphorie.

Nebenwirkungen: Coffein entzieht dem Körper Flüssigkeit (Dehydration). Bei sehr hohen Dosen können Schweissausbrüche, Herzflattern, Harndrang, Herzrhythmusstörungen, starke Wahrnehmungsstörungen, Zittern, Nervosität und Schlafstörungen vorkommen.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht: Jede Party hat einmal ein Ende.

