

## Vorsicht: XTC-Tablette mit 2C-B



Logo	Champagner (Moët & Chandon)	Champagner (Moët & Chandon)
Gewicht	216.9 mg	214.7 mg
Grösse	3.9 x 13.1 mm	3.9 x 13.1 mm
Dicke	4.0 mm	4.2 mm
Bruchrille	Ja	Ja
Farbe	Gold	Gold
Inhaltsstoffe	<b>2C-B*HCl: 15.1 mg</b> <b>2C-H*HCl: 0.3 mg</b> <b>MDMA*HCl: 1.2 mg</b>	<b>2C-B*HCl: 11.2 mg</b>
Getestet in	Bern (DIB+), 24. Januar 2018	Zürich (DIZ), 30. Januar 2018

### Risikoeinschätzung

2C-B ist ein synthetisches, halluzinogenes Meskalinderivat, welches bereits in kleinen Mengen psychoaktiv wirkt. Da sich die volle Wirkung erst nach ca. 60 Minuten einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und dadurch ungewollt eine hohe Dosis 2C-B eingenommen wird. Ab 10 mg stellt sich eine halluzinogene Wirkung ein, welche evtl. als unangenehm empfunden wird und zu einer psychischen Überforderung führen kann.

**XTC-Tabletten mit dem gleichen Erscheinungsbild (Logo, Grösse, Gewicht, Farbe etc.) können trotzdem unterschiedlich hoch dosiert sein und/oder unterschiedliche Wirkstoffe enthalten!**

### Infos zu 2C-B

**Substanz:** 2C-B (2,5 Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin).

**Dosierung:** Geschluckt 5 bis 25 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen; 2 mg mehr oder weniger haben einen grossen Einfluss auf die Wirkung. **Dosiere vorsichtig!**

**Wirkungseintritt / Wirkdauer:** Nach ca. 30-60 Min. / ca. 4-8 Std.

**Wirkung:** Wahrnehmungen und Gefühle werden intensiviert und eine leichte Euphorie kann sich einstellen. Ab 10-15 mg erhält die Wirkung einen halluzinogenen Charakter. Grenzen zwischen Innen und Aussen lösen sich auf. Farbige Muster, leuchtende Felder um Personen und Gegenstände werden wahrgenommen. Der Rausch dauert weniger lang und wird als weniger tief empfunden als bei LSD, Psylocibin oder Meskalin.

**Nebenwirkungen:** Die Pupillen weiten sich, der Blutdruck steigt an und es kann zu Übelkeit, Schweissausbrüchen und Schwindelanfällen kommen. Magen- und Darmbeschwerden und leichte allergische Reaktionen (Husten aufgrund vermehrter Schleimproduktion) treten vereinzelt auf. Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Angstgefühle bis hin zur Todesangst sind Risiken, welche auf psychischer Ebene auftreten können. Der Konsum kann latente (verborgene) psychische Störungen zum Vorschein treten lassen!

**Safer Use:** Nie alleine konsumieren, unbedingt auf Set und Setting achten und 2C-B nur an Orten, an denen man sich wohlfühlt, konsumieren! Kein Mischkonsum!

### Generelle Safer-Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe oder eine drittel Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende!