

Warnung: Extrem hochdosierte Diaphin-Tabletten



Risikoeinschätzung

Bei Diaphin handelt es sich um den Markennamen von Tabletten, welche den Wirkstoff **Diacetylmorphin (Heroin)** enthalten. Diaphin-Tabletten werden zur heroingestützten Behandlung von heroinabhängigen Patienten eingesetzt und beinhalten 200 mg Diacetylmorphin (Heroin). Diese Dosis ist für Personen, bei denen sich eine hohe Toleranz eingestellt hat und die sich in einer heroingestützten Behandlung befinden, unproblematisch. Für Personen, welche nicht regelmässig Opiode konsumieren, ist sie aber deutlich zu hoch, da ohne eine Toleranz die **tödliche orale Dosis bei Heroin wesentlich tiefer** liegt. Nasaler und intravenöser Konsum erhöht die Gefahr für eine tödliche Überdosierung noch zusätzlich. Im Vergleich zu anderen Opioiden wie zum Beispiel Tilidin, Codein oder Tramadol verfügt Diacetylmorphin (Heroin) über ein bis zu 25fach stärkeres Wirkungspotenzial.

Bei Diaphin-Tabletten wird zwischen zwei galenischen Formen unterschieden: Diaphin IR (immediate release) und Diaphin SR (slow release). Der Unterschied besteht darin, dass der Wirkstoff bei IR-Tabletten unmittelbar freigesetzt wird, wohingegen bei den SR-Tabletten der Wirkstoff verzögert freigesetzt wird. Dieser Effekt verschwindet aber, wenn die Tablette aufgebrochen oder zerkleinert wird.

Bei einer Überdosierung von Heroin droht eine Atemdepression mit tödlichen Folgen.

Es sollte unbedingt auf Mischkonsum mit anderen dämpfenden Substanzen wie Alkohol, Ketamin, andere Opiode oder Benzodiazepine verzichtet werden, da diese die Gefahr einer Atemdepression noch zusätzlich erhöhen.

Von einem Konsum dieser Tabletten ohne ärztliche Verschreibung wird abgeraten!

Infos zu Diacetylmorphin

Substanz: Diacetylmorphin (DAM) / Heroin

Dosierung: Die Dosis ist von der individuellen Toleranz gegenüber Heroin abhängig. Bereits tiefe Dosen können bei ungeübten Usern tödliche Folgen haben. Bei nasalem Konsum muss die Dosierung noch zusätzlich reduziert werden, da die Substanz über die Nasenschleimhaut direkt ins Blut aufgenommen wird.

Wirkdauer: 2–5 Std

Wirkung: Schmerzlindernd, ausgleichend-beruhigend, angstlösend und euphorisierend. Dem euphorischen «Flash» zu Beginn folgen ein Zustand des Wohlbefindens und ein Gefühl der Gleichgültigkeit, Gelassenheit, Unbeschwertheit und Selbstzufriedenheit.

Risiken / Nebenwirkungen: Verlangsamung der Atmung, Übelkeit, Erbrechen, Juckreiz, Blutdruckabfall, Pulsverlangsamung, Pupillenverengung und Harnverhaltung können auftreten. Sehr hohes Abhängigkeitspotenzial mit einem starken körperlichen Entzug. Hohe Dosen Heroin können ohne rechtzeitige ärztliche Hilfe tödlich sein!

Safer Use Regeln

- Wenn du dir nicht sicher bist, um welche Substanz es sich handelt, lass die Tabletten in einem Drug Checking analysieren.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Konsumiere nicht allein und informiere deine Freunde darüber was genau du konsumierst.
- Verzichte auf Mischkonsum.